

سفتازیدیم

ceftazidime

گروه درمانی : آنتی بیوتیک ، سفالوسپورین نسل سوم

اشکال دارویی :

For Inj : 1g, 2g, 500mg

راه تجویز : IV Inf / IV / IM

اندیکاسیون

۱) درمان باکتری می / سپتی سمی : ۱g وریدی یا عضلانی
هر ۸ تا ۱۲ ساعت براساس شدت و نوع بیماری تا ۶g
روزانه قابل افزایش است.

۲) درمان عفونت مجاری تنفسی / ادراری / ژنیکوماستی
/ عفونت استخوان و مفاصل

۳) درمان تجربی در بیماران febrile neutropenic

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت به پنی سیلین ها و سفالسپورین ها

عارضه جانبی

(۱) سردرد

(۲) سرگیجه

(۳) تشنج

(۴) تهوع و استفراغ

(۵) کولیت پسودومامبرانو

(۶) راش

(۷) کهیر

(۸) اگرانولوسیتوز

توجهات پرستاری

(۱) ممکن است تزریق عضلانی دارو اندکی ناراحت کننده باشد .

(۲) در صورت اسهال شدید یا علایم کولیت پسودومامبرانو باید دارو را قطع کرد.

(۳) به ازای هر $g \frac{5}{100}$ باید ۵ ml آب مقطر اضافه کرده و به خوبی تکان داد.

۴) دی اکسید کربن در ویال تولید شده که ایجاد فشار مثبت می کند .

۵) قبل از درمان کشت و آنتی بیوگرام تهیه گردد.