

سفترياکسون

ceftriaxone ® Rocephin

گروه درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی :

For Inj : 250,500,mg,1g

راه تجویز : IV Inf / IM / IV

اندیکاسیون

(۱) درمان باکتریایی ، عفونت ادراری ، سپتی سمی ، عفونت ادراری : ۱-۲g به صورت وریدی یا عضلانی روزی یک بار یا به صورت منقسم روزی ۲ بار . حداکثر دوز روزانه ۴g می باشد .

(۲) پروفیلاکسی پیش از جراحی

(۳) مننژیت گنوکوکی

(۴) آندوکاردیت

PID (۵)

(۶) گونوره بدون عارضه

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت به سفالوسپورین ها

(۲) حساسیت به پنی سیلین ها

عارضه جانبی

(۱) سردرد

(۲) سرگیجه

(۳) تهوع و استفراغ

(۴) کولیک

(۵) تورم

(۶) واکنش حساسیتی

(۷) تب و لرز

(۸) سنگ ادراری

توجهات پرستاری

(۱) برای تهیه محلول 100 mg/ml به ازای هر 250 mg پودر دارو باید $2/4\text{ ml}$ از حلال مناسب از قبیل آب مقطر ، N/S و یا D5W به ویال افزوده شود.

(۲) قبل از تجویز دارو ، از بیمار کشت و آنتی بیوگرام تهیه شود.

(۳) احتمال خونریزی / هیپوترومبینمی وجود دارد.

(۴) محل تزریق از نظر التهاب و تورم بررسی شود.