

کلیندامایسین

clindamycin

گروه درمانی : آنتی بیوتیک

اشکال دارویی :

cap : 150mg

Inj : 150 mg/ml

susp : 75mg/5ml

راه تجویز : IM / IV / PO

اندیکاسیون

(۱) عفونت ناشی از ارگانیسم های حساس : ۴۵۰mg -

۱۵۰ خوراکی هر ۶ ساعت یا ۲۷۰۰mg - ۶۰۰

روزانه، IM یا IV منقسم به ۲-۴ دوز مساوی

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط

(۲) کولیت در اثر آنتی بیوتیک

(۳) آسم

(۴) اختلال عملکرد کبد یا کلیه

عارضه جانبی

(۱) تهوع و استفراغ

(۲) اسهال

(۳) درد شکمی

(۴) بی اشتها

(۵) مدفوع خونی

(۶) اریتم مولتی فرم

(۷) ترومبوسیتوپنی

(۸) هیپوتانسیون

توجهات پرستاری

(۱) به ازای هر 300mg از دارو باید 17ml حلال مناسب از فبیل N/S و یا دکستروز ۵٪ استفاده شود (یا به میزان بیشتر)

(۲) بیمار باید دارو را با یک لیوان کامل آب مصرف بکند.

۳) در صورت ایجاد اسهال دارو قطع بشود.

۴) تزریق IM باید عمیق انجام بگیرد و محل تزریق عضلانی باید دائماً عوض شود.