

کلوگزاسیلین

cloxacillin

گروه درمانی : آنتی بیوتیک ، پنی سیلین مقاوم به پنی سیلیناز

اشکال دارویی :

cap :or Tab :250 ,500mg
For Inj : 250,250mg/vial

راه تجویز : IM / IV / PO

اندیکاسیون

(۱) عفونت های دهان ناشی از استافیلوکوک ها: ۵۰۰mg
خوراکی هر ۶ ساعت

(۲) سیالو آدنیت باکتریایی : ۵۰۰mg داخل وریدی هر ۶
ساعت به مدت سه روز

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت به پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها

(۲) اختلال عملکرد کلیه

(۳) آلرژی

عارضه جانبی

(۱) لکوپنی

(۲) اگرانولوسیتوز

(۳) تهوع و استفراغ

(۴) اسهال

(۵) نفريت بينايینی

(۶) ائوزینوفیلی

(۷) دردایپگاستر

توجهات پرستاری

(۱) در آغاز درمان از بیمار کشت و نمونه آنتی بیوگرام تهیه شود.

(۲) دارو را با معده خالی و با یک لیوان پر از آب مصرف نمایند.

(۳) دوره درمان (روز ۱۴-۱۰) را کامل کنید.

(۴) کپسول ها را نشکنید، خرد نکنید و نجوید.

(۵) دریافت کافی مایعات (۲ لیتر) در طی حملات اسهال .