

دگزامتازون

Dexamethason

گروه درمانی : ضد التهاب، گلوکوکورتيكوئيد، ايمونوساپرسانت

اشكال دارویی :

Tab : 0.5mg

Elixir : 0.5mg/5ml

Inj : 8mg/2ml

oph.drops : 0.1 %

راه تجویز : local/IM/IV/PO

انديکاسيون

(۱) واکنش آلرژیک

(۲) شرایط التهابی

(۳) نئوپلازی : ۹-۷۵ mg / خوراکی ۴-۲ بار روزانه

(۴) درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی : ۲۰ mg-
۱۰ وریدی قبل از شیمی درمانی

(۵) التهاب پلک ، ایدوسیکلیت

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط

(۲) عفونت سیستمیک قارچی

عارضه جانبی

(۱) سرخوشی

(۲) سردرد

(۳) بی قراری

(۴) عصبانیت

(۵) بی خوابی

(۶) ادم

(۷) هیپرتانسیون

(۸) زخم پپتیک

(۹) ضعف و آتروفی عضله

(۱۰) هیپرگلیسمی

توجهات پرستاری

- (۱) از تزریق عضلانی در عضله دلتوئید اجتناب نمایید و تزریق عضلانی باید در توده عضلانی حجیم صورت گیرد.
- (۲) جهت کاهش علائم GI ، داروی خوراکی را همراه با غذا یا شیر مصرف نمایند.
- (۳) تزریق IV مستقیم داروی رقیق نشده طی یک دقیقه یا کمتر صورت می گیرد یا می توان آن را با کلرید سدیم ۵/۹ درصد یا D5W رقیق کرده با سرعت دستور داده شده ، انفوزین شود.
- (۴) در صورت سیاه شدن مدفوع یا درد شکم فوراً گزارش نماید.