

دکستروز

Dextrose 5%.10%.20%,50%

گروه درمانی : جانشین مایعات،تامین کننده کالری

اشکال دارویی :

Inf : 50ml,500ml.1000ml(20%)

Inf : 50ml,500ml.1000ml(50%)

Inf : (500,1000ml)10%

Inf : (500,1000ml)5%

راه تجویز : IV/Infu/IV

اندیکاسیون

- (۱) در درمان هیپوگلیسمی به علت انسولین
- (۲) در درمان هیپوگلیسمی به علت تامین کالری
- (۳) به عنوان جانشین کننده مایعات

کنتراندیکاسیون

- (۱) هذیان
- (۲) کومای دیابتی
- (۳) آنوری
- (۴) کومای کبدی
- (۵) بیماران خونریزی داخل مغزی و نخاعی
- (۶) DM
- (۷) مصرف همزمان با کورتون

عارضه جانبی

- (۱) سندرم هیپراسمولار
- (۲) گیجی
- (۳) ادم ریه
- (۴) نارسایی احتقانی قلب
- (۵) هیپرتانسیون
- (۶) هیپوکالمی
- (۷) هیپومنیزیمی
- (۸) هیپوفسفاتی

توجهات پرستاری

۱) سرعت انفوزین وریدی این دارو نباید بیشتر از $5/5$ در ساعت شود.

۲) نباید این محلول را همزمان با خون با ست مشترک تجویز نمود (خطر همولیز)

۳) فقط از محلول شفاف استفاده گردد.