

# دiazepam

## Diazepam

گروه درمانی : ضد اضطراب ، آرام بخش ، خواب آور ، شل کننده عضلانی

اشکال دارویی :

Tab : 2,5,10mg

Supp : 5mg,10mg(Rectal)

Inj : 10mg/2ml

Syrp : 2mg/5ml

راه تجویز : Rec/IM/IV slow/PO

اندیکاسیون

(۱) درمان کمکی تشنج : ۱۰-۲۰ mg روزانه ۴-۲ بار

(۲) اضطراب

(۳) اسپاسم عضلانی

(۴) سندرم قطع الک

- (۵) درمان کمکی برای آندوسکوپی  
(۶) تتانی

### کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط  
(۲) کوما  
(۳) مسمومیت حاد الکلی  
(۴) گلوکوم حاد زاویه بسته  
(۵) MG  
(۶) پارکینسون  
(۷) سایکوز  
(۸) آترواسکلروز  
(۹) افراد مستعد به اعتیاد

### عارضه جانبی

- (۱) سردرد  
(۲) سرگیجه  
(۳) لتارژی  
(۴) سرخوشی

(۵) کلاپس قلبی - عروقی

(۶) برادیکاردی

(۷) یبوست

(۸) دویینی

### توجهات پرستاری

- (۱) تزریق IM، باید آهسته و عمیق باشد.
- (۲) بیمار نباید الکل و داروهای تضعیف کننده CNS مصرف بکند.
- (۳) از انجام کارهای مخاطره آمیز مثل رانندگی پرهیز نماید.
- (۴) تزریق عضلانی دارو تا حدودی دردناک می باشد.
- (۵) بعد از تزریق وریدی بیمار بایستی به مدت ۳ ساعت در وضعیت ریکامبند باقی بماند.
- (۶) محل تزریق وریدی باید از نظر تورم، گرمی، درد و سفتی وریدی بررسی شود.