

دiazoxide

Diazoxide

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون ، ضد هیپوگلیسمی

اشکال دارویی :

Inj : 300mg/20ml

Cap : 50,100mg

راه تجویز : IV/PO

اندیکاسیون

۱) درمان هیپرتانسیون : دیازوکساید $3-1 \text{ mg/kg}$ هر ۱۵-۵ دقیقه (حداکثر 150 mg)

۲) درمان هیپوگلیسمی (ناشی از افزایش انسولین)
 $8-3 \text{ mg/kg}$ خوراکی ، روزانه در ۳-۲ دوز مساوی
منقسم

کنترل اندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) تنگی آئورت
- (۳) اختلال مغزی یا قلبی
- (۴) اورمی
- (۵) حاملگی

عارضه جانبی

- (۱) سردرد
- (۲) سرگیجه
- (۳) بی خوابی
- (۴) ضعف
- (۵) تشنج
- (۶) احساس سرخوشی
- (۷) هیپرتانسیون
- (۸) شوک
- (۹) تهوع و استفراغ

توجهات پرستاری

- (۱) دارو را به صورت رقیق نشده استفاده کنید.

- ۲) بعد از تجویز IV، باید بیمار را ۵/۰ ساعت به حالت درازکش نگه داشت.
- ۳) فقط از محلول شفاف، جهت درمان استفاده نمود.
- ۴) محلول این دارو، باید دور از نور نگهداری بشود.
- ۵) هنگام تجویز وریدی، دارو نباید از رگ خارج بشود.
- ۶) به بیمار تذکر بدهید که هیرسوتیسم ایجاد شده، برگشت پذیر است.