

دیگوکسین

Digoxin ® Lanoxine

گروه درمانی : ضد آریتمی ، اینوتروپیک

اشکال دارویی :

Tab : 0.25mg

Inj : 0.5mg/2ml

Elixir : 0.05mg/ml(60ml)

oral Drops : 0.5mg/ml

راه تجویز : IV slow/PO

اندیکاسیون

۱) درمان نارسایی احتقانی قلب.

۲) درمان تاکیکاردی پاروکسیسمال دهلیزی.

۳) درمان فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی.

شروع با ۱mg-۰/۵ خوراکی یا وریدی روزانه در

دوزهای منقسم و سپس دوز نگهدارنده ۰/۵-۰/۱۲۵

خوراکی روزانه هر ۱۲ ساعت

کنتراندیکاسیون

- (۱) علایم مسمومیت با گلیکوزیدهای قلبی
- (۲) حساسیت مفرط
- (۳) سندرم سینوس کاروتید حساس
- (۴) WPW
- (۵) فیبریلاسیون بطنی
- (۶) MI حاد
- (۷) پریکاردیت فشارنده
- (۸) هیپوکالمی
- (۹) هیپوکسی

عارضه جانبی

- (۱) توهم
- (۲) سردرد
- (۳) سرگیجه
- (۴) استئوپروز
- (۵) دیس ریتمی
- (۶) هیپوتانسیون
- (۷) تهوع و استفراغ

۸) تاری دید

توجهات پرستاری

۱) می تواند به صورت رقیق نشده مصرف و یا هر ۱ml از دارو با ۴ml از سرم LR , D5W , N/S , SW ترکیب شود.

۲) در صورت نبض کمتر از ۶۰ بار در دقیقه تجویز دارو قطع گردد.

۳) دارو نباید به طور ناگهانی قطع گردد.

۴) بیمار را از نظر علایم مسمومیت با این دارو، تحت نظر داشته باشید.

۵) می توان این دارو را قبل یا بعد از غذا مصرف نمود.