

دوبوتامین

Dobutamine ® Dobutrex

گروه درمانی : اینوتروپیک

اشکال دارویی :

For I.V Inf : 12.5mg/ml(20ml)

راه تجویز : IV Inf

اندیکاسیون

۱) افزایش برون ده قلبی (درمان کوتاه مدت
۲۰mcg/min - ۲/۵ ، انفوزین وریدی تا حداکثر
۴۰ mcg/min دوز

کنتراندیکاسیون

۱) حساسیت مفرط به دارو

۲) سابقه هیپرتانسیون

(۳) حاملگی

(۴) شیردهی

(۵) اطفال

(۶) MI

عارضه جانبی

(۱) ضریان اکتویک قلب

(۲) درد قفسه سینه

(۳) طپش قلب

(۴) هیپرتانسیون

(۵) آنژین

(۶) تهوع و استفراغ

(۷) پارستزی

(۸) آنافیلاکسی

توجهات پرستاری

(۱) قبل از تجویز باید ویال ۲۰ ml دارو را رقیق کرد تا حداقل به حجم ۵۰ ml برسد.

(۲) بررسی الکترولیت ها ، فشار خون ، برون ده ادراری لازم است .

۳) مراقب خروج دارو از رگ باشید.

۴) دارو را نباید با بی کربنات سدیم مخلوط کرد .

۵) محل تزریق وریدی برای پیشگیری از ایجاد فلیت ، جا به جا شود.

۶) محلول تهیه شده را می توان در درجه حرارت 15°C - ۲ تا ۴۸ ساعت و در درجه حرارت اتاق تا ۶ ساعت نگهداری کرد.