

دوپامین

Dopamin ® Inotropin

گروه درمانی : تنگ کننده عروق ، اینوتروپیک قلبی

اشکال دارویی :

Inj : 200mg/5ml

راه تجویز : IV Inf

اندیکاسیون

(۱) درمان کمکی در شوک برای افزایش برون ده قلبی،
فشار خون و جریان ادراری : ۵-۲ mcg/min ، انفوزین
وریدی تا حداکثر دوز ۵۰ mcg/min

(۲) درمان کوتاه مدت نارسایی مزمن ، مقاوم و شدید قلبی

کنتراندیکاسیون

(۱) فتوکروموسیتوم

- (۲) فیبریلاسیون بطنی
- (۳) تاکی آریتمی کنترل نشده
- (۴) سرمازدگی
- (۵) حاملگی
- (۶) آسم
- (۷) بیماری ایسکمیک قلبی

عارضه جانبی

- (۱) طپش قلب
- (۲) آنژین
- (۳) دیس ریتمی بطنی
- (۴) انقباض نانجا
- (۵) تکیکاردی
- (۶) برادیکاردی
- (۷) تهوع و استفراغ
- (۸) سیخ شدن موها

توجهات پرستاری

(۱) هر آمپول ۱۰ یا ۵ میلی لیتری باید در ۵۰-۲۵۰ ml از D5/NS , D5W , N/S و یا LR رقیق شود.

(۲) قبل از شروع درمان ، باید هیپوولمی بیمار را درمان نمود.

(۳) از مخلوط کردن این دارو با بی کربنات سدیم ، پرهیز شود.

(۴) این دارو نباید از رگ خارج بشود .

(۵) اسیدوز اثر دوپامین را کم می نماید .