

اپی نفرین

Epinephrine ® Adrenalin

گروه درمانی : بالا برنده فشار خون ، برونکودیلاتور

اشکال دارویی :

Disposable Injector : 1mg/ml (1:10000) (وارداتی)

Inj : 1mg/ml (1:10000)

sterile eye Drops : 1%

راه تجویز : S.C / IM / (فرم وارداتی) IV

اندیکاسیون

(۱) درمان خط اول در بیماران ایست قلبی-تنفسی (نوع وارداتی)

(۲) آنافیلاکسی ، واکنش های افزایش حساسیت mg: ۱/۵-۱/۰ به صورت IM یا SCL

(۳) گشاد کنندگی برونشی

کنترل اندیکاسیون

- (۱) دیلاتاسیون قلبی
- (۲) دیس ریتمی قلبی
- (۳) شوک
- (۴) گلوکوم زاویه بسته
- (۵) هیپرتانسیون
- (۶) پارکینسون
- (۷) افراد مسن

عارضه جانبی

- (۱) سردرد
- (۲) سرگیجه
- (۳) عصبانیت
- (۴) بی قراری
- (۵) دیس ریتمی
- (۶) هیپرتانسیون
- (۷) تغییرات EKG
- (۸) تهوع ، استفراغ
- (۹) تاری دید

توجهات پرستاری

(۱) کاهش برون ده ادراری و انقباض عروق کلیه در ابتدای درمان ایجاد می شود .

(۲) در افراد سالمند مراقب افزایش ناگهانی فشار خون باشید.

(۳) دارو را نباید با محلول های قلیایی مخلوط نمود .

(۴) در تزریق SC بهتر است از سرنگ انسولین استفاده شود.

(۵) هر ۱ ml (۱mg) از اپی نفرین ۱:۱۰۰۰ باید حداقل در ۱۰ ml از N/S رقیق شده تا محلول ۱:۱۰۰۰۰ را بسازد.