

فورسماید

Furosemide ® Lasix

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون ، دیورتیک
اشکال دارویی :

s.Tab : 40 mg

Inj : 10mg/ml(2ml,4ml)

Infusion : 250mg/25ml

راه تجویز : IM / IV Info / IV / PO

اندیکاسیون

- (۱) درمان هیپرتانسیون : ۴۰mg خوراکی ، روزانه ۲ بار
- (۲) درمان هیپرکلسمی : ۱۰۰mg-۸۰mg وریدی هر ۱ تا ۳ ساعت یا ۱۲۰mg خوراکی
- (۳) درمان ادم حادریه : ۴۰mg وریدی آهسته و سپس در صورت لزوم ۸۰mg وریدی در طی یک ساعت

(۴) نارسایی مزمن کلیه : ۸۰mg خوراکی ، روزانه که می توان روزانه تا ۱۲۰mg افزایش داد.

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) آنوری
- (۳) شیردهی
- (۴) آسیت
- (۵) سیروز کبدی
- (۶) مصرف همزمان با گلیگوزیدهای قلبی

عارضه جانبی

- (۱) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۲) دهیدراتاسیون
- (۳) لکوپنی
- (۴) هیپوکالسمی
- (۵) هیپومنیزیمی
- (۶) هیپوکالمی
- (۷) هیپرگلیسمی

توجهات پرستاری

- ۱) برای کاهش علائم GI دارو با غذا یا شیر مصرف شود .
- ۲) برای جلوگیری از بی خوابی ، دارو در صبح خورده شود.
- ۳) بیمار باید از تغییر وضعیت ناگهانی ، اجتناب بکند .
- ۴) مصرف مایعات تا ۳-۲ لیتر در روز افزایش یابد ، مگر اینکه ممنوع باشد.
- ۵) این دارو را می توان همراه با غذا تجویز کرد .
- ۶) این دارو را می توان بدون رقیق کردن به صورت وریدی آهسته تجویز کرد.