

هالوپریدول

Halopridol ® Halodal

گروه درمانی : ضد سیکوز

اشکال دارویی :

s.Tab : 0/5,2,5mg

Inj : 5ml/mg

Inj : 50ml/mg

oral solu

راه تجویز : IM / PO

اندیکاسیون

۱) سایکوز: ۲-۵/۰ خوراکی ۲ تا ۳ بار روزانه یا ۵-۲
عضلانی هر ۸-۴ ساعت

۲) دلیریوم

۳) بیماران سایکوتیک که نیاز به درمان طولانی مدت دارند.

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) دیس کرازی های خونی
- (۳) دپرسیون مغز استخوان
- (۴) کوما
- (۵) دپرسیون CNS
- (۶) اختلالات کبدی
- (۷) پورفیری حاد

عارضه جانبی

- (۱) علایم اکستراپیرامیدال
- (۲) سندرم نورولپتیک بدخیم
- (۳) تشنج
- (۴) آسیتول
- (۵) اسهال
- (۶) لکوپنی
- (۷) وزوز گوش
- (۸) تاری دید
- (۹) درماتیت تماسی

توجهات پرستاری

- (۱) داروی خوراکی را با غذا یا شیر تجویز کنید.
- (۲) تزریق عضلانی باید در یک توده حجیم عضلانی صورت بگیرد و حداکثر ۳ میلی لیتر از دارو در یک محل تزریق شود.
- (۳) بیمار باید تا ۳۰ دقیقه دراز بکشد.
- (۴) هیچگاه به صورت وریدی تزریق نگردد. (نوع دکانوات)
- (۵) در صورت بروز علائم اکستراپیرامیدال سریعاً گزارش شود
- (۶) برای جلوگیری از یبوست مصرف مایعات را افزایش دهد.