

هپارین

heparin Sodium

گروه درمانی : ضد انعقاد

اشکال دارویی :

Inj : 5000,10000 u/ml

راه تجویز : SC/IV

اندیکاسیون

(۱) پروفیلاکسی آمبولی ، بعد از MI : ۵۰۰۰u زیر جلدی
هر ۸-۱۲ ساعت

(۲) باز نگه داشتن کاتتر ثابت IV : ۱۰۰-۱۰۰۰u push

(۳) آثرین صدري ناپايدار

(۴) آمبولی ریوی

(۵) جراحی قلب باز : ۴۰۰-۱۵۰۰u/kg انفوزین وریدی
پیوسته

کنتراندیکاسیون

- (۱) دیس کرازی های خونی
- (۲) زخم باز
- (۳) خونریزی فعال
- (۴) حساسیت مفرط
- (۵) ترومبوسیتوپنی شدید
- (۶) احتمال خونریزی مغزی
- (۷) هموفیلی

عارضه جانبی

- (۱) خونریزی
- (۲) ترومبوسیتوپنی
- (۳) هماتوم زخم
- (۴) واکنش افزایش حساسیت

توجهات پرستاری

- (۱) قبل از درمان و در طی درمان PLT/CBC و تست های انعقادی انجام شود.

- ۲) دارو در ساعت مشخص (جهت ثابت نگه داشتن سطح خونی تزریق شود).
- ۳) در تزریق زیر جلدی ناحیه را ماساژ نداده و آسپیره نکنید.
- ۴) بیمار از لحاظ خونریزی لثه ، بینی ، هماچوری ، ملنا ، استفراغ خونی بررسی شود.
- ۵) در هنگام تجویز این دارو باید ، پروتامین سولفات در دسترس باشد.
- ۶) بهتر است هیچ تزریق عضلانی انجام نشود.