

هیدرالازین

Hydralazine

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون

اشکال دارویی :

C.Tab : 10,25,50mg

For Inj : 20mg/vial

راه تجویز : IM / IV / PO

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون متوسط تکراری: ۱۰mg خوراکی روزانه ۴ بار

(۲) نارسایی احتقانی قلب : ۷۵-۵۰mg خوراکی

(۳) هیپرتانسیون شدید : ۵۰-۱۰mg عضلانی یا ۲۰-۱۰mg وریدی

(۴) بحران هیپرتانسیون حاملگی : ابتدا ۵mg وریدی و سپس ۱۰-۵mg وریدی هر ۳۰-۲۰ دقیقه

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) بیماری شریان کرونر
- (۳) بیماری روماتیسمی دریچه میترا
- (۴) اختلالات شدید کلیوی
- (۵) آریتمی بطنی
- (۶) اطفال

عارضه جانبی

- (۱) هیپوتانسیون ارتواستاتیک
- (۲) دیس ریتمی
- (۳) تائیکاردی
- (۴) طپش قلب
- (۵) سرگیجه
- (۶) تهوع و استفراغ
- (۷) راش
- (۸) نوتروپنی
- (۹) اگرانولوسیتوز

توجهات پرستاری

- (۱) بهتر است دارو با غذا مصرف گردد.
- (۲) بیمار باید از تغییر وضعیت ناگهانی، پرهیز کند.
- (۳) هیدرالازین را نباید با محلول های تزریقی مخلوط کرد.
- (۴) بررسی نبض و فشار خون بیمار هر ۵ دقیقه و به مدت ۲ ساعت و سپس هر یک ساعت برای مدت ۲ ساعت و سپس هر ۴ ساعت لازم است.
- (۵) این دارو پس از تماس با فلز تغییر رنگ می دهد که این تغییر رنگ در مدت ۱۲-۸ ساعت دلیل از دست رفتن قدرت دارو نمی باشد.