

لیدوکائین

Lidocaine

گروه درمانی : ضد آریتمی ، بی حس کننده موضعی

اشکال دارویی :

IV Inj : 1% ,2%(5ml)

For IV Infusion : 20%

For Continuous IV Inf : 1% ,2% ,4%(50ml)

Top.oint : 5%

Top.cream : 2.5% ,5%

راه تجویز : SC / IM / IV / LocaL

اندیکاسیون

(۱) آریتمی متعاقب MI

(۲) آریتمی متعاقب مسمومیت با دیژیتال : ۱ mg/kg

با سرعت ۵۰-۲۵ mg/min وریدی و در صورت لزوم

تکرار بعد از ۵ دقیقه

(۳) بی حس کننده موضعی : حداکثر دوز ۷ mg/kg می باشد.

کنترل اندیکاسیون

- (۱) بلوک قلبی
- (۲) اختلالات هدایت قلبی
- (۳) هیپوولمی
- (۴) شوک شدید
- (۵) برادیکاردی
- (۶) دپرسیون تنفسی
- (۷) نارسایی احتقانی قلب

عارضه جانبی

- (۱) افسردگی
- (۲) ترمور
- (۳) لتارژی
- (۴) بی خوابی
- (۵) هیجان
- (۶) تشنج

(۷) هیپوتانسیون

(۸) ایست قلبی

توجهات پرستاری

- (۱) تزریق IM بهتر است در دلتوئید صورت گیرد.
- (۲) در صورت مشاهده دپرسیون قطعه ST در EKG دارو قطع گردد.
- (۳) در زمان تجویز ترالی اورژانس در دسترس باشد.
- (۴) قبل از انجام بی حسی اپیدورال ، تست پوستی انجام شود.
- (۵) بهتر است محلول های حاوی آدرنالین در انتها استفاده نشود.
- (۶) از تجویز و مصرف این دارو در طی انقباضات قوی رحمی یا موقع زایمان پرهیز شود.