

# متوکلوپرامید

## Metoclopramide Hcl

گروه درمانی : ضد استفراغ ، مشتق PABA

اشکال دارویی :

Tab : 10mg

Inj : 10mg/2ml

oral drops : 60mg/15ml

راه تجویز : IM / IV / PO

### اندیکاسیون

(۱) درمان رفلاکس گاستروازوفایئال : ۱۵-۱۰ mg  
خوراکی روزانه ۴ بار ، ۳۰ دقیقه قبل از غذا

(۲) استفراغ : ۱۰ mg خوراکی

(۳) گاستروپارزی دیابتی

(۴) پیشگیری از استفراغ های بعد از عمل

## کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) فتوکروموسیتوم
- (۳) GIB
- (۴) پارگی روده
- (۵) پارکینسون
- (۶) نارسایی کلیه
- (۷) صرع
- (۸) انسداد روده

## عارضه جانبی

- (۱) اضطراب
- (۲) بی قراری
- (۳) سرگیجه
- (۴) کاهش لیبیدو
- (۵) تب
- (۶) راش
- (۷) سردرد
- (۸) علایم اکستراپیرامیدال

## توجهات پرستاری

- (۱) از مصرف هم زمان با داروهای تضعف CNS پرهیز شود.
- (۲) از کارهای مخاطره آمیز از قبیل رانندگی پرهیز شود.
- (۳) نباید دارو را به طور سریع تزریق نمود .
- (۴) آمپول از نظر شفافیت بررسی شود.
- (۵) در صورتیکه دوز دارو بیش از ۱۰ mg نباشد می توان دارو را رقیق نشده تجویز کرد . در دوزهای بیش از ۱۰ mg حداقل ۵۰ ml از محلول های LR , R , N/S , D5W برای رقیق سازی و انفوزیون استفاده شود.