

مترونیدازول

Metronidazol ® Flagyl

گروه درمانی : ضد آمیب، ضد باکتری، ضد تک یاخته

اشکال دارویی :

Tab : 250mg

IV Inf : 500mg/100ml

Topical and Vaginal gel : 0.75%

oral susp : 12.5mg/5ml

supp : 500mg

راه تجویز : Vaginal / IV Inf / PO

اندیکاسیون

(۱) درمان ژiardیازیس : ۲۵۰ mg خوراکی ، روزانه ۳ بار

به مدت ۵ روز

(۲) درمان تریکومونیازیس : ۲۵۰ mg خوراکی ، روزانه ۳

بار به مدت ۷ روز

۳) آمیبیاز روده‌ای: ۷۵۰ mg خوراکی ، روزانه ۳ بار به مدت ۵ روز

۴) آیسه آمیبی کبد : ۷۵۰-۵۰۰ mg خوراکی ، روزانه ۳ بار به مدت ۱۰ روز

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط
- ۲) سه ماهه اول حاملگی
- ۳) شیردهی
- ۴) بیماری فعال CNS
- ۵) مصرف هم زمان کورتون
- ۶) اختلال شدید کبدی

عارضه جانبی

- ۱) سردرد
- ۲) سرگیجه
- ۳) افسردگی
- ۴) ضعف
- ۵) خستگی
- ۶) پارسنتزی اندام ها

(۷) تشنج

(۸) آتاکسی

(۹) بیوست

(۱۰) تهوع و استفراغ

(۱۱) کاهش لیپیدو

توجهات پرستاری

(۱) فرم تزریقی دارو آماده است و نیازی به رقیق سازی ندارد.

(۲) قبل و در طی درمان WBC بیمار چک گردد.

(۳) در بیماران دارای بیماری کبدی دوزاژ دارو کم گردد.

(۴) این دارو با آلومینیوم ناسازگار می باشد.

(۵) در صورت ایجاد سمیت CNS دارو باید قطع گردد.