

پنی سیلین جی + پروکائین

Penicillin G(procaine potassium)

گروه درمانی : آنتی بیوتیک ، پنی سیلین

اشکال دارویی :

For Inj : 400/000 u/vial

pen.G potassium : 100/000 u/vial + Pen.G procaine : 300/00

For Inj : 800/000 u/vial

Pen.G potassium : 200/000 u/vial + Pen.G procaine : 600/00

راه تجویز : IM/

اندیکاسیون

(۱) عفونت های سیستمیک متوسط تا شدید به علت
ارگانیسم های حساس : ۴۰۰/۰۰۰ به صورت عضلانی
هر ۱۲-۲۴ ساعت.

(۲) پیشگیری از عفونت در جراحی های وسیع فوقانی

۳) پیشگیری از عفونت در شکستگی های مرکب فک

کنترل اندیکاسیون

۱) حساسیت مفرط به پنی سیلین

۲) اختلال عملکرد کلیوی

عارضه جانبی

۱) تشنج

۲) نوروپاتی

۳) تهوع و استفراغ

۴) اسهال

۵) آنمی همولیتیک

۶) ترومبوسیتوپنی

۷) نارسایی احتقانی قلب

توجهات پرستاری

۱) دارو را به صورت عضلانی تجویز کنید.

۲) تزریق در نزدیکی اعصاب محیطی بزرگ ، منجر به آسیب عصبی می شود.