

فنی توئین

phenytoin ® Dilantin

گروه درمانی : ضد صرع ، مشتق هیدانتوئین

اشکال دارویی :

Cap : 50,100mg

Inj : 250mg/5ml

susp : 30mg/5ml

راه تجویز : IV Inf / IV / PO

اندیکاسیون

(۱) درد نوروتیک

(۲) درمان تشنج تونیک - کلونیک .

(۳) درمان تشنج نورولپتیک

(۴) درمان استاتوس اپی لپتیکوس : ۱۵-۱۰ mg/kg

وریدی به آهستگی تجویز گردد.

کنترل اندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) بلوک سینوسی
- (۳) برادیکاردی سینوسی
- (۴) سندرم آدامز-استوکس
- (۵) DM
- (۶) هیپوتانسیون
- (۷) نارسایی میوکارد
- (۸) MI
- (۹) پورفیری حاد

عارضه جانبی

- (۱) آتاکسی
- (۲) سردرد
- (۳) سرگیجه
- (۴) عصبانیت
- (۵) استیون - جانسون
- (۶) حساسیت به نور
- (۷) هیپرپلازی لثه

(۸) ترومبوسیتوپنی

(۹) اگرانولوسیتوز

توجهات پرستاری

(۱) در صورت تجویز وریدی ، سرعت تجویز نباید بیش از 50 mg/min باشد.

(۲) تزریق سریع دارو می تواند باعث افت فشار و کلاپس قلبی گردد.

(۳) جهت انفوزین دارو باید از سرم N/S و در طی نیم ساعت استفاده نمود.

(۴) استفاده از سایر محلول ها جهت تزریق سبب رسوب دارو خواهد شد.

(۵) بیمار باید بهداشت دهان و دندان را رعایت کند.

(۶) در تزریق وریدی ، محل تزریق را از نظر پیشگیری از انفیلتراسیون در انسج اطراف ، کنترل کنید.