

پروپرانولول

Propranolol ® Inderal

گروه درمانی : ضد هیپرتانسیون
اشکال دارویی :

F.C.Tab : 10mg
S.F.C.Tab : 40,80mg
S.R.Tab : 80,160mg
Inj.1mg/ml

راه تجویز : IV / PO

اندیکاسیون

- (۱) درمان هیپرتانسیون : ۸۰mg خوراکی روزانه در ۲-۴ دوز منقسم
- (۲) درمان کمکی اضطراب
- (۳) درمان کمکی در تیروتوکسیکوز
- (۴) پیشگیری از میگرن

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) تاقیکاردی سینوسی
- (۳) نارسایی قلبی
- (۴) شوک کاردیوژنیک
- (۵) DM
- (۶) بیماری شدید تنفسی
- (۷) نارسایی کرونر

عارضه جانبی

- (۱) ضعف
- (۲) توهم
- (۳) لتارژی
- (۴) استفراغ
- (۵) اسهال
- (۶) برادیکاردی
- (۷) نارسایی احتقانی قلب
- (۸) هیپوتانسیون
- (۹) برونکواسپاسم

توجهات پرستاری

- (۱) جذب دارو با تجویز همراه با غذا ، افزایش پیدا می کند .
- (۲) هر ۱mg را می توان با ۱۰ ml از N/S یا D5W رقیق کرد.
- (۳) قطع دارو باید به صورت تدریجی باشد.
- (۴) می توان قرص را خرد و با مایعات به بیمار داد.
- (۵) در صورت ضربان قلب کمتر از ۶۰ بار در دقیقه و یا فشارخون سیستولیک کمتر یا مساوی ۹۰ mmHg دارو قطع گردد.
- (۶) نباید با سایر دارو ها مخلوط گردد. (خطر سمیت)