

رانیتیدین

Ranitidine ® Zantac

گروه درمانی : ضد ترشح اسید معده، H_2 بلاکر
اشکال دارویی :

F.C Tab : 150
Inj : 50mg/2ml

راه تجویز : IM / IV Infu / PO

اندیکاسیون

- (۱) درمان زخم معده و دئودنوم : ۱۵۰mg روزانه به صورت خوراکی و ۲ بار در روز و یا ۳۰۰mg قبل از خواب
- (۲) درمان نگهدارنده در زخم دئودنوم
- (۳) بیماری رفلاکس معده به مری (GERD)
- (۴) سندرم زولینگر آلیسون
- (۵) پروفیلاکسی اولسراسترس

۶) سوزش سردل ، سوء هاضمه و جراحی معده

کنتراندیکاسیون

- ۱) حساسیت مفرط
- ۲) سابقه پورفیری حاد
- ۳) اختلال عملکرد کبدی یا کلیوی

عارضه جانبی

- ۱) ضعف
- ۲) آرتیتاسیون
- ۳) بی خوابی
- ۴) شکم درد
- ۵) یبوست
- ۶) ترومبوسیتوپنی
- ۷) لکوپنی
- ۸) خارش در محل تزریق

توجهات پرستاری

(۱) برای تزریق وریدی هر ۵۰mg آن باید از ۲۰ml از N/s یا سایر محلول های سازگار از قبیل LR , R , D5W رقیق شود.

(۲) PH مخزن در حد ۵ نگهداری شود.

(۳) بهتر است همراه با غذا تجویز شود .

(۴) در دراز مدت می تواند باعث کمبود ویتامین B_{۱۲} گردد.

(۵) فرم عضلانی این دارو نیاز به رقیق کردن ندارد.

(۶) ژنیکوماستی و ناتوانی جنسی به دنبال مصرف طولانی مدت دارو بروز می کند که برگشت پذیر می باشند.