

سوکسینیل کولین

Succinylcholine

گروه درمانی : شل کننده عضلات اسکلتی

اشکال دارویی :

Inj : 100mg/ml(10ml), 20mg/ml , 50mg/ml(10ml,2ml)

For Inj : 100,500,1000mg

راه تجویز : IV / IM

اندیکاسیون

(۱) شل کننده عضلات اسکلتی

(۲) کاهش انقباض عضلانی در تشنج

(۳) تسهیل انتوباسیون : ۰/۶ mg/kg وریدی در طی
۳۰-۱۰ ثانیه

کنتراندیکاسیون

- (۱) گلوکوم زاویه بسته
- (۲) صدمات نافذ چشم
- (۳) هیپرترمی بدخیم
- (۴) پاراپلژی
- (۵) اختلالات الکترولیتی
- (۶) ایست قلبی—عروقی
- (۷) دیستروفی عضلانی

عارضه جانبی

- (۱) برادیکاردی
- (۲) دیس ریتمی قلبی
- (۳) ایست سینوسی
- (۴) آپنه
- (۵) هیپرترمی بدخیم
- (۶) آنافیلاکسی
- (۷) دپرسیون طولانی تنفسی

توجهات پرستاری

(۱) برای انفوزیون مداوم دارو در طی بیهوشی ۱g دارو را به ۵۰۰ml یا یک لیتر از D5/NS، D5W یا N/S اضافه کرده تا به ترتیب غلظت های ۲ و ۱mg/ml حاصل شود. با حل کردن ۱۰۰mg دارو در یک لیتر غلظت ۰/۱mg/ml به دست می آید.

(۲) تزریق عضلانی باید به صورت عمیق انجام شود.

(۳) راه هوایی را از ترشحات دهانی پاک کنید.