

تیوپنتال

Thiopental ® pentothal

گروه درمانی : سداتیو-بیهوشی عمومی-باربیتورات کوتاه اثر
اشکال دارویی :

Powder for Injection : 500mg, 1g
Inj : 250mg/ml , 50mg/ml(20ml)

راه تجویز : IV

اندیکاسیون

(۱) بیهوشی عمومی : ۲-۳ml از محلول ۲/۵ درصدی
وریدی با فواصل ۲۰-۴۰ ثانیه تجویز می گردد.

کنترل اندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط

(۲) پوفیری حاد متناوب

- (۳) شوک
- (۴) استاتوس آسماتیکوس
- (۵) میگزدم
- (۶) آنمی شدید
- (۷) MG
- (۸) ICP ↑
- (۹) دهیدراتاسیون

عارضه جانبی

- (۱) اضطراب
- (۲) بی خوابی
- (۳) فراموشی
- (۴) دپرسیون میوکارد
- (۵) تاکیکاردی
- (۶) دیس ریتمی
- (۷) لارنگواسپاسم
- (۸) تهوع و استفراغ
- (۹) درد شکمی

توجهات پرستاری

- (۱) هر ۵۰۰mg از پودر استریل دارو باید با حداقل ۲۰ ml از D5W ترکیب شده تا محلول ۲/۵% را بسازد.
- (۲) محلول های غلیظ ترا از ۲/۵% سبب همولیز می گردد.
- (۳) دارو تا ۲۴ ساعت قابلیت نگهداری دارد.
- (۴) دوز دارو را در بیماران مسن و بیماران کبدی کاهش دهید.
- (۵) دارو را به آهستگی تزریق نمایید.
- (۶) در طی بیهوشی و ضمن ریکاوری علائم حیاتی بیمار را هر ۳-۵ دقیقه کنترل کنید.