

وراپامیل

Verapamil ® Isoptin

گروه درمانی : ضد آنژین صدری ، ضد هیپرتانسیون ،
ضد آریتمی

اشکال دارویی :

C.Tab : 40 mg, 80 mg

Inj : 5mg/2ml

S.R.F.C Tab : 250mg

راه تجویز : IV slow / PO

اندیکاسیون

(۱) هیپرتانسیون : ۸۰mg خوراکی ، روزانه ۳ بار

(۲) درمان آنژین پرنیزمتال / پایدار / ناپایدار :
۸۰-۱۲۰mg خوراکی هر ۸-۶ ساعت

(۳) آریتمی قلبی

(۴) پروفیلاکسی میگرن

(۵) سردرد کلاستر

(۶) تاقیکاردی سینوسی و PAC علامت دار : ۵ mg به
صورت وریدی آهسته ، تکرار تا ۳ دوز به فاصله هر ۵
دقیقه

کنتراندیکاسیون

(۱) حساسیت مفرط

(۲) نارسایی احتقانی قلبی

(۳) شوک کاردیوژنیک

(۴) برادیکاردی سینوسی

(۵) هیپوتانسیون

(۶) بلوک AV درجه II و III

عارضه جانبی

(۱) ادم

(۲) بلوک قلبی

(۳) نارسایی احتقانی قلب

(۴) سرگیجه

(۵) درد شکم

(۶) ادم ریه

(۷) اختلالات انعقادی

توجهات پرستاری

- (۱) دارو را می توان رقیق نشده یا رقیق شده با D5W استفاده کرد.
- (۲) این دارو در محلول های دارای PH بیشتر از ۶ رسوب می کند .
- (۳) تزریق وریدی باید در مدت بیش از ۲ دقیقه صورت گیرد.
- (۴) غذا جذب شکل خوراکی این دارو را نمی دهد.
- (۵) در فشار خون سیستول زیر ۱۰۰ و نبض کمتر از ۵۰bpm تجویز نشود.
- (۶) بیمار باید از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز کند.
- (۷) محلول باید شفاف باشد.