

فنوباریتال

phenobarbital

گروه درمانی : ضد تشنج ، آرام بخش ، خواب آور

اشکال دارویی :

Tab : 15, 60 , 100 mg

Inj : 200mg/ml

راه تجویز : IV Inf / IM / PO

اندیکاسیون

(۱) آرام بخش : ۱۲۰-۳۰۰ mg خوراکی در ۲-۳ دوز
منقسم

(۲) آرام بخش پیش از جراحی : ۲۰۰-۱۰۰ mg عضلانی
، ۶۰-۹۰ دقیقه قبل از عمل

(۳) بی خوابی : ۳۲۰-۱۰۰ mg خوراکی یا عضلانی

کنتراندیکاسیون

- (۱) حساسیت مفرط
- (۲) پورفیری
- (۳) نفریت
- (۴) سابقه اعتیاد به دارو
- (۵) بیماری شدید تنفسی
- (۶) برونکوپنومونی
- (۷) آسم
- (۸) اختلال عملکرد کلیوی

عارضه جانبی

- (۱) خواب آلودگی
- (۲) کابوس های شبانه
- (۳) گیجی
- (۴) دپرسیون CNS
- (۵) لتارژی
- (۶) استیون-جانسون
- (۷) هیپوتانسیون
- (۸) میوز

۹) برونکواسپاسم

توجهات پرستاری

- ۱) در صورت عدم امکان بلع می توان قرص را خرد نمود ولی نباید جویده شود
- ۲) از مصرف محلول کدر و تیره خودداری نمائید.
- ۳) بیرون زدگی دارو از رگ منجر به نکروز بافتی می شود .
- ۴) این دارو اثر ضد دردی ندارد.
- ۵) در مصرف طولانی مدت کمبود ویتامین B_{12} می دهد.